


蚊の発生を防ごう

水たまりをなくすのが効果的！

蚊の一生



蚊の一生


卵は2～3日でふ化し、ボウフラになり7～10日ほどかけて、サナギになります。そして2～3日後に成虫になります。
つまり、週に一度水たまりをなくせばいいのです！

発生原因


チェックリストです。発生源を探してみましょう。



- ☐ ●空缶・空きビン
水たまりが小さくても繁殖するので、片付ける。




- ☐ ●植木鉢の受け皿
庭先やベランダに注意。水がたまったままにしない。




- ☐ ●バケツ・ジョウロ
水をためておかない。裏返して置くと良い。



- ☐ ●古タイヤ
捨てるか水抜き穴をあける。



- ☐ ●ビニールシート
たるみをなくす。



- ☐ ●放置容器
不要なものは捨てる。汲み置き水に注意。

★蚊に対して殺虫剤を散布することは、一時的に効果はありますが長続きしません。殺虫剤はあくまでも補助的に使用し、使いすぎに気をつけましょう。

★蚊に刺されないようにするために、網戸の使用や、蚊の発生しやすい場所では、なるべく長袖長ズボンを着用しましょう。場合によっては虫除けスプレーや蚊取り線香を利用しましょう。虫除けスプレーを小児に使用する場合は、取扱説明書に従ってください。

★蚊は行動範囲が広いので、対策を地域全体で行うことが大切です。ご近所で声をかけ合い、蚊の発生場所をなくしましょう。